

CLASSIFICAÇÕES E ÍNDICES DA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL

RETOCOLITE ULCERATIVA

CLASSIFICAÇÃO DE MONTREAL – EXTENSÃO DA DOENÇA

Classificação	Extensão
E1 – proctite ulcerativa	Envolvimento limitado ao reto
E2 – colite ulcerativa E (colite distal)	Envolvimento até a flexura esplênica
E3 – colite ulcerativa extensa (pancolite)	Envolvimento proximal à flexura esplênica

Montreal, 2005

ÍNDICE DE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA

GRAVIDADE DO SURTO AGUDO TRUELOVE E WITTS

	Leve	Moderada	Grave
1. Número de evacuações/dia	≤4	4 a 6	> 6
2. Sangue vivo nas fezes	±	+	++
3. Temperatura	Normal	Valores intermediários	Temperatura média noturna > 37,5°C ou > 37,8°C em 2 dias dentro de 4 dias
4. Pulsos	Normal	Intermediário	> 90 bpm
5. Hemoglobina (g/dL)	> 10,5	Intermediária	< 10,5
6. VHS (mm/1ª hora)	< 30	Intermediária	> 30 mm, 1ª hora

VHS: velocidade de hemossedimentação.

Truelove SC, Witts LJ. Br Med J. 1995; 2 : 1041-8

_____ :
_____ :
_____ :

_____ :
_____ :
_____ :

ÍNDICE DE GRAVIDADE DA DOENÇA ESCORE DA CLÍNICA MAYO

Escore	N. evacuações	Sangramento retal	Achados endoscópicos	Avaliação global
0	N. habitual	Ausência	Ausência de doença ou doença inativa (cicatriz)	Normal
1	1 a 2 vezes além do habitual	Laivos de sangue – menos da metade das evacuações	Doença leve (eritema, ↓ do padrão vascular, leve friabilidade)	Doença leve
2	3 a 4 vezes além do habitual	Sangue vivo na maioria das evacuações	Doença moderada (eritema evidente, perda do padrão vascular, erosões)	Doença moderada
3	5 ou mais vezes além do habitual	Evacuação apenas com sangue	Doença grave (sangramento espontâneo, ulcerações)	Doença grave

Schroeder KW, Tremaine WJ, Ilstrup DM. N Engl J med 1987; 317 (26) : 1625-9

Escore (pontos)	Gravidade da doença
0 a 2	Normal – remissão
3 a 5	Atividade leve
6 a 10	Atividade moderada
11 a 12	Atividade grave

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

DOENÇA DE CROHN

CLASSIFICAÇÃO DE MONTREAL - EXTENSÃO DA DOENÇA

Idade do diagnóstico (A)			
A1	16 anos ou mais novo		
A2	17 a 40 anos		
A3	Acima de 40 anos		
Localização (L)		GI Superior (L4)	
L1	Íleo terminal	L1+L4	Íleo terminal + superior GI
L2	Cólon	L2+L4	Cólon + superior GI
L3	Ileocólon	L3+L4	Ileocólon + superior GI
L4	GI superior		
Comportamento (B)		Doença perianal (p)	
B1	Não estenosante Não penetrante	B1p	Não estenosante + perianal
B2	Estenosante	B2p	Estenosante + perianal
B3	Penetrante	B3p	Penetrante + perianal

Montreal, 2005

ÍNDICE DE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA HARVEY E BRADSHAW

	Pontuação
Estado geral (ótimo = 0; bom = 1; regular = 2; mau = 3; péssimo = 4)	0 – 4
Dor abdominal (ausente = 0; duvidosa = 1; moderada = 2; grave = 3)	0 – 3
Numero de evacuações líquidas/dia	nº/dia
Massa abdominal (ausente = 0; duvidosa = 1; bem definida = 2; bem definida e dolorosa = 3)	0 – 3
Complicações: artralgia/artrite, uveíte/irite, eritema nodoso, aftas orais, pioderma gangrenoso, fissura anal, fístula, abscesso etc.	1 ponto cada

< 8: inativa leve; 8 a 10: leve/moderada; > 10: moderada/grave.

Harvey RF, Bradshaw, Lancet 1980; 1 : 514

_____ :
 _____ :
 _____ :

_____ :
 _____ :
 _____ :

ÍNDICE DE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA

IADC – CROHN`S DISEASE ACTIVITY INDEX

	Multiplicado por
Número de evacuações líquidas na última semana	2
Dor abdominal (ausente = 0; leve = 1; moderada = 2; grave = 3).	5
Considerar a soma total dos dados individuais da última semana	
Estado geral (ótimo = 0; bom = 1; regular = 2; mau = 3; péssimo = 4).	7
4). Considerar a soma total dos dados individuais da última semana	
N. de sintomas/sinais associados - alistar por categorias: a) Artralgia/artrite; b) Irite/uveíte; c) Eritema nodoso/pioderma gangrenoso/aftas orais; d) Fissura anal, fístula ou abscesso; e) Outras fístulas; f) Febre	- 20 - (Valor máximo = 120)
Consumo de antidiarreico (não = 0; sim = 1)	30
Massa abdominal (ausente = 0; duvidosa = 2; bem definida = 5)	10
Déficit do hematócrito: homens: 47-Ht; mulheres: 42-Ht (diminuir em vez de somar no caso Ht do paciente ser > do que o padrão)	6
Peso*: porcentagem abaixo do esperado (diminuir em vez de somar se o peso do paciente for maior que o esperado)	1
<p>Soma total (IA da doença de Crohn) = < 150 = Remissão 150 a 250 = Leve 250 a 350 = Moderada > 350 = Grave</p> <p>*Peso esperado ou ideal = $\text{Altura (m)}^2 \times 25,5 = \text{_____kg}$ (homens) $\text{Altura (m)}^2 \times 22,5 = \text{_____kg}$ (mulheres)</p>	

Best WR, etal, 1976

_____ :
 _____ :
 _____ :

_____ :
 _____ :
 _____ :