

TRIAGEM PARA TUBERCULOSE

| ANAMNESE DIRIGIDA | SIM | NÃO |
|---|-----|-----|
| Tosse Produtiva por > 3 semanas | | |
| Febre Vespertina | | |
| Sudorese Noturna | | |
| Inapetência | | |
| Perda de Peso (> 10% do peso ideal) | | |
| Astenia | | |
| História Anterior de Tratamento para TB | | |
| História Familiar de TB | | |
| História de Quimioprofilaxia Anterior para TB | | |
| Contato Recente com TB | | |

IMUNIDADE ESPECÍFICA CONTRA *M. tuberculosis*

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| PPD | Data de Realização do teste ____ / ____ / ____ | Resultado do Teste _____mm | Classificação do paciente <input type="checkbox"/> Positivo (PPD ≥ 5mm) <input type="checkbox"/> Negativo (PPD < 5mm) |
| IGRA | Data de Realização do teste ____ / ____ / ____ | Valor de referência: Negativo | Resultado do teste <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |

RADIOGRAFIA DO TÓRAX

| | |
|--|--|
| Data da realização do exame ____ / ____ / ____ | Resultado do exame <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Imagem suspeita ou sequela de TB <input type="checkbox"/> Compatível com sequela de TB |
|--|--|

Se o PPD for positivo (≥ 5 mm) e/ou o RX de Tórax mostrar sinais de TB latente Deve ser iniciada a quimioprofilaxia com Isoniazida (300 mg/dia) por 6 meses*

| PPD | RX de Tórax | Profilaxia TB |
|--------|---------------|---------------------------|
| < 5 mm | Normal | Não Indicada |
| < 5 mm | Sequela de TB | Iniciar Quimioprofilaxia |
| ≥ 5 mm | Sequela de TB | Avaliação do Especialista |
| ≥ 5 mm | Normal | Iniciar Quimioprofilaxia |

Data de início da Quimioprofilaxia ____ / ____ / ____